

FRANCOLINO DI MONTE


Bonasa bonasia



Foto: Scieggi



Il **FRANCOLINO DI MONTE** (*Bonasa bonasia*) è la più piccola delle quattro specie di tetraoni autoctoni



Un tempo era presente su tutta la catena alpina

Oggi la sua distribuzione si è notevolmente ridotta

Molto più comune nelle regione settentrionale del continente



FEMMINA



Il suo **piumaggio** è detto
“**criptico a foglia morta**”

In età adulta prende una
colorazione che richiama i
chiaroscuri del bosco, dove si
mimetizza perfettamente

caruncole più
sviluppate

cresta erettile
più visibile

colorazione nera
del sottogola

più grande

MASCHIO




RIPRODUZIONE

Il periodo riproduttivo parte a marzo con le **parate nuziali** e dura fino a metà maggio



La femmina depone a **terra** in posti ben nascosti **dalle 6 alle 10 uova**



La **schiusa** avviene tra maggio e giugno. I pulli restano **con la madre** fino a settembre

In autunno le nuove coppie si formano. Il francolino è una **specie monogama**



HABITAT

Lo si incontra a quote altimetriche comprese **tra i 700 e i 1.500 m.**

Ama i **fitti boschi misti** di conifere e latifoglie, ricchi di **sottobosco** e con **ampie radure.**

così da avere a disposizione germogli, bacche e legumi



Ma allo stesso tempo giovare della protezione contro i predatori, in particolare i rapaci come l'astore



! Potenzialmente minacciato (NT)

Le principali **minacce** per la specie sono:



Alterazione dell'habitat



Disturbo delle zone riproduttive



Cambiamento climatico



Braconaggio



Alta mortalità dei pulcini alla schiusa

